

FICHA TÉCNICA **BOMBARDIER**

Cop 000/EC Extracto 1500g / 100ml 300g/20 L V.E Registro 1 de 3

CARACTERÍSTICAS

BOMBARDIER es un nuevo concepto de Bioestimulante de origen vegetal, completo y versátil, debido a su exclusivo proceso de obtención natural por fermentación bacteriana. Este proceso dota a Bombardier, en su composición global, de 2 grandes bloques de elementos orgánicos:

- Un primer bloque compuesto por un aminograma específico y completo, que nos aporta una bioestimulación y biofertilización equilibrada.
- Un segundo bloque que aporta macronutrientes, especialmente nitrógeno orgánico, bioestimulantes naturales y carbohidratos.

Todo ello proporciona un formulado exclusivo y diferenciador que consigue que BOMBARDIER alcance un resultado óptimo debido a su alto nivel de absorción y asimilación que proporciona a los cultivos la superación de fases de estrés, desarrollo vegetativo, aumento del calibre de frutos, aumento de calidad y producción, además de una mejora de la estructura del terreno cuando se aplica vía suelo.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	%p/v
Aminoácidos libres	21,7
Nitrógeno (N) total	10,8
Nitrógeno orgánico	5,4
Nitrógeno amoniacal	5,4
Extracto húmico total	35,9
Materia orgánica total	72,9
Carbono (C) orgánico	41,0
Sodio total (Na ₂ O)	1,86

FICHA TÉCNICA BOMBARDIER

Código FIC: FIC-1510 / FIC-1510-1 Fecha de V.F.: Página 2 de 3

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido color marrón.
- pH: 5.5 – 7.5.
- Densidad: 1,25 – 1,31 g/cc.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	2 L/ha	Macollaje	Aplicación Foliar. Realizar hasta 2 aplicaciones con intervalo de 14 días.
MAIZ (<i>Zea mays</i>)	2 L/ha	Inicio de cultivo (V4)	Aplicación Foliar. Realizar hasta 2 aplicaciones con intervalo de 14 días.
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	1 L/ha	Instalación del cultivo	Aplicación Foliar a la aparición de síntomas de estrés.
MANGO (<i>Mangifera indica</i>)	5 L/ha	Inicio del ciclo	Aplicación en drench o fertirrigación. Realizar 4 aplicaciones con intervalo de 14 días.
TOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	2-3 L/ha	Instalación del cultivo	Aplicación Foliar a la aparición de síntomas de estrés.
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	2-3 L/ha	Instalación del cultivo	Aplicación Foliar a la aparición de síntomas de estrés.
UVA (<i>Vitis vinifera</i>)	5 L/ha	Inicio del ciclo	Aplicación en drench o fertirrigación. Realizar 4 aplicaciones con intervalo de 14 días.
ROSAS (<i>Rosa</i> sp.)	5 L/ha	Inicio del ciclo	Aplicación en drench o fertirrigación. Realizar 5 aplicaciones con intervalo de 14 días.
BROCCOLI (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Italica</i>)	2-3 L/ha	Instalación del cultivo	Aplicación Foliar. Realizar hasta 2 aplicaciones con intervalo de 14 días.
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	2-3 L/ha	Inicio del cultivo	Aplicación Foliar. Realizar hasta 2 aplicaciones con intervalo de 14 días.

AGITAR ANTES DE USAR

FICHA TÉCNICA **BOMBARDIER**

Cop 000/EC Excm 0500/0004 Rev 00 V. F Página 3 de 3

Compatibilidades:

No mezclar con azufre ni cobre. No mezclar con productos de alta reacción alcalina (aceites minerales). No utilizar junto con productos basados en peróxido de hidrógeno o cloro porque pueden disminuir el efecto de BOMBARDIER.

Para su aplicación en continuo en tanques de fertilización, se recomienda diluir el producto hasta un máximo del 50% para evitar la pérdida de propiedades del mismo.

Debido a su origen natural en algunas ocasiones puede contener leves posos que no afectan ni a la composición ni a la eficacia del producto.

Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 L, 5 L, 20 L, 215 L y 1.000 L.