



Decis

INSECTICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO: Deltametrina.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado emulsionable (EC) que contiene 25 g de ingrediente activo por litro de producto comercial.

ACCIÓN FITOSANITARIA: DECIS® es un insecticida piretroide que controla eficazmente insectos del orden de lepidópteros, coleópteros, homópteros y otros.

MODO DE ACCIÓN: DECIS® es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, produciendo inactividad de movimientos. Es un producto liposoluble, lo cual permite ser absorbido por la pared vegetal. Esta propiedad le permite tener una excelente resistencia al lavado en caso de lluvias fuertes.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: En cultivos de ciclo corto se recomiendan máximo dos aplicaciones entre los primeros treinta días de desarrollo de la planta. En Rosa se recomiendan 2 aplicaciones en bloque cada 7 días durante la rotación.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Vierta la mitad de agua y agregue la dosis recomendada de DECIS DECIS®, agite la mezcla y complete con agua el resto. Mantenga el agitador funcionando durante las operaciones de llenar, mezclar y rociar. Asegúrese de contar con el equipo necesario para dosificar, mezclar y aplicar el producto. Lavar el equipo al terminar la aplicación. Asegúrese de utilizar siempre el equipo de protección personal consistente en: botas de hule, mascarilla, anteojos protectores, guantes, dosificador y aplicador.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: DECIS® es compatible con todos los pesticidas, inclusive se puede mezclar con Propanil en arroz sin problemas de fitotoxicidad. No es compatible con Caldo Bordelés, Arseniato de Calcio o Zinc.

COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: No presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada y con los métodos sugeridos.

PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo en caso de inhalación o ingestión. Puede ser tóxico para organismos acuáticos. Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el

paciente al médico y muéstrole la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II. Moderadamente peligroso.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día. Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.

REGISTRO AGROCALIDAD: 21-I1/NA

RECOMENDACIONES DE USO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l / ha)	PC (Periodo de Carenia)
ROSA <i>Rosa sp.</i>	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	0.3	No aplica
UVA <i>Vitis vinifera L.</i>	Trips <i>Thrips tabaci</i>	*0.3	7 días
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Pulguilla <i>Epitrix cucumeris</i>	0.35	90 días

*Uva, dosis equivalente a 0,05% con un gasto de agua de 600 l/ha.
Dosis calculada para un consumo de agua de 1000 l/ha.
Gasto de agua: papa 600 l/ha.

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com