



LUNA TRANQUILITY®

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC).

INGREDIENTE ACTIVO: Fluopyram + Pyrimethanil.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:

LUNA TRANQUILITY® es un fungicida foliar formado por dos ingredientes activos complementarios Fluopyram 125 g/l + Pyrimethanil 375 g/l.

ACCIÓN FITOSANITARIA: La eficacia sin igual de LUNA TRANQUILITY® sobre las enfermedades más problemáticas en cultivos ornamentales como Botrytis, Mildew polvoso vas más allá de los logros de los fungicidas de hoy. No sólo protege la planta en el campo, sino que también ayuda a proteger la producción después de la cosecha, aportando al incremento de la calidad y cantidad de los tallos comercializables.

MODO DE ACCIÓN: Fluopyram y Pyrimethanil son fungicidas de acción translaminar y sistémica.

MECANISMO DE ACCIÓN: Fluopyram es un inhibidor del Succinato deshidrogenasa que actúa a nivel de la cadena respiratoria del patógeno; mientras que Pyrimethanil interviene en el metabolismo de los hongos, inhibiendo la secreción de enzimas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación de LUNA TRANQUILITY® con los primeros síntomas de la enfermedad, con intervalos de 90 días para banano. Para rosas de acuerdo al umbral.

MÉTODO DE APLICACIÓN: LUNA TRANQUILITY® debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas - FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo. Debido al alto número de especies ornamentales, el usuario asume la

responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con objeto de evaluar el riesgo de fito-toxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: En la dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados sin embargo se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: No presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada y con los métodos sugeridos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: III. Ligeramente peligroso.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día. Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.

REGISTRO AGROCALIDAD: 198-F1/NA

RECOMENDACIONES DE USO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l / ha)	PC (Periodo de Carenia)
ROSA Rosa sp.	Botrytis Botrytis cinerea	0.8	No aplica
BANANO Musa acuminata AAA	Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis	0.8	1 día

Dosis calculada para un consumo de agua de 1200 l/ha.

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com