



PREVALOR®

FUNGICIDA AGRICOLA

Líquido Soluble (SL).

Propamocarb + Fosetyl

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Está formulado como Concentrado Soluble (SL), que contiene 530 g de Propamocarb + 310 g de Fosetyl por litro de formulación.

ACCIÓN FITOSANITARIA: PREVALOR® otorga un control efectivo de algunos hongos Oomycetes (*Pythium* sp., *Phytophthora* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Aphanomyces*, *Bremia*, *Plasmopara*) del suelo responsables de la caída de plántulas o "damping off" y tristeza del follaje en cultivos hortícolas y almacigueros. Por otra parte destaca su efecto preventivo sobre Mildíu en los mismos cultivos.

PREVALOR® estimula los medios naturales de defensa de la planta minimizando la posibilidad de aparición de cepas resistentes. Promueve, de forma paralela, un aumento en el vigor de las plantas (efecto fitotónico).

Puede ser utilizado como tratamiento de semillas, de material de trasplante o en aplicaciones foliares. El producto debe manejarse siguiendo las normas de manejo de plaguicidas.

MODO DE ACCIÓN: Presenta sistemía completa, ascendente y descendente, una rápida penetración y modo de acción preventivo y curativo.

Es un producto sistémico que se trasloca dentro de la planta después de su absorción por las raíces a las hojas. No es fitotóxico y puede aplicarse en cualquier estado de desarrollo de las plantas. Además de su efecto fungicida, tiene una acción bioestimulante en la mayoría de los cultivos.

MECANISMO DE ACCIÓN: Propamocarb inhibe la formación de la membrana celular del hongo, además de inhibir la producción y germinación de esporas. Por su parte, Fosetyl destaca por su efecto preventivo sobre germinación de esporas y su efecto curativo sobre esporulación y desarrollo de micelio, además de ser un activador del sistema de autodefensa de la planta. Este ingrediente activo estimula la producción de fitoalexinas con su consecuente efecto SAR (siglas en inglés de Resistencia Sistémica Adquirida).

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación de PREVALOR® con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades. Debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas – FRAC.

Complementando con prácticas de manejo del cultivo.

MÉTODO DE APLICACIÓN: La estrategia de control del problema es esencialmente preventiva. De acuerdo a la presencia de la enfermedad e infección del hongo en las plantas se recomienda la aplicación de PREVALOR® desde aplicaciones preventivas antes que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: PREVALOR® es compatible con la mayoría de pesticidas agrícolas. De todos modos es recomendable efectuar pruebas previas de compatibilidad. No se recomienda hacer mezclas de tanque con fertilizantes líquidos o reguladores de crecimiento.

COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: No presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada y con los métodos sugeridos.

PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo en caso de inhalación o ingestión. Puede ser tóxico para organismos acuáticos. Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II. Moderadamente peligroso.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día. Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.

REGISTRO AGROCALIDAD: 208-F1/NA

RECOMENDACIONES DE USO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	PC (Periodo de Carencia)
ROSA <i>Rosa</i> sp.	Mildiu veloso <i>Peronospora sparsa</i>	2.0	No aplica

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com