



SCALA®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC).

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:

SCALA® es una suspensión concentrada (SC) que contiene 400 g por litro de producto comercial.

ACCION FITOSANITARIA: Es un fungicida para el control de hongos deuteromicetos que pertenece al grupo químico de las ANILINOPYRIMIDINAS.

MODO DE ACCIÓN: SCALA® es un fungicida sistémico translaminar de acción protectante y curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibe la secreción de enzimas requeridas para el proceso de infección, además inhibe la extensión del tubo germinativo y el crecimiento micelial, impidiendo así las posibilidades de infección.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: 7 días. La última aplicación debe realizarse 14 días antes de la cosecha.

MÉTODO DE APLICACIÓN: SCALA® es selectivo al cultivo a las dosis recomendadas, se aconseja calibrar el equipo de aplicación de preferencia gota fina y evitar la deriva. Cuando se aplique en invernaderos se debe usar el equipo completo de protección.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: SCALA® es compatible con otros productos para ampliar su espectro, la mezcla con estos productos se debe aplicar en forma inmediata después de la preparación. En la mezcla con otros productos se deben hacer pruebas de compatibilidad antes de aplicarlas. Incompatible con WUXAL SUSPENSIÓN, productos alcalinos y que contengan aluminio.

COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: Por precaución, en ornamentales se deben hacer pruebas de tolerancia en variedades nuevas. El producto no es fitotóxico al cultivo, a las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo en caso de inhalación o ingestión. Puede ser tóxico para organismos acuáticos. Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: III. Ligeramente peligroso.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día. Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.

REGISTRO AGROCALIDAD: 83-F1/NA

RECOMENDACIONES DE USO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC
ROSA (<i>Rosa</i> sp.)	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 l/ha	No aplica
UVA (<i>Vitis vinifera</i> L.)	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	200 cc/tanque	21 días

VOLUMEN DE AGUA: ROSA: 1200 Litros. UVA: 200 Litros

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com